





▲ Dr. Jakab Gábor a vizsgálatban részt vevő 22 központ képviselőjében

A glatiramer acetáttal kezelt SM-betegek kétéves vizsgálatának eredményei

▲ **A VIZSGÁLAT CÉLJA** az volt, hogy saját tapasztalataink alapján értékeljük a kezelés hosszú távú hatását a hullámzó lefolyású, ún. relapszáló-remittáló sclerosis multiplexre (RRSM). 2001-ben összesen 193 RRSM beteg kezdte alkalmazni a glatiramer acetátot. Közülük hatan különböző okok (terhesség, rosszabbodás, mellékhatások) miatt hamar abbahagyták a kezelést. Az első év után 187 beteg – 45 férfi (24%), 142 nő (76%) – kezelési adatait elemeztük statisztikai módszerekkel. A második év folyamán újabb 8 beteg fejezte be a kezelést. A betegek életkora 18 és 54 év ($41,1 \pm 8,4$) között mozgott. A kezelés megkezdésekor az SM fennállásának időtartama átlagban $10,1 \pm 5,5$ év volt. A rokkantság mértékét kifejező ún. EDSS- (Kiterjesztett Fogyatékosági Skála) érték minden kezelt beteg esetében 5,5 pont alatt volt, átlagosan 2,88.



A betegeket évente 4 alkalommal ellenőriztük. Az utánkövetés során előre meghatároztuk, hogy a glatiramer acetát kezelés hatékonyságát a következő szempontok alapján fogjuk megítélni: hogyan alakul a visszaesések (shubok) száma, a shub-mentes betegek aránya, az SM miatt kórházban töltött napok száma, és hogyan változik az általános és helyi mellékhatások gyakorisága és súlyossága. Ezeket az adatokat a kezelést megelőző fél évben tapasztaltakhoz viszonyítottuk. A maradványtünetek által okozott tartós fogyatékoságot az említett EDSS pontozóskálával értékeltük. Az alábbiakban összefoglaljuk a követéses vizsgálat fontosabb megállapításait: